


DISC

RHEU

No 10

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
RHEUMATISMO ACUTO.



DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
RHEUMATISMO ACUTO;

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,
D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.
ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;
NEC NON
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI Consensu;
Et NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit
JACOBUS PEARSON SMITH,
ANGLUS;

SOCIET. REG. MED. EDIN. SOC.

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

*Dolor ipse disertum
Fecit.*

OVID. Metam. xiii. 228.

EDINBURGI:
EXCUDEBANT G. STEWART ET SOCII,
ACADEMIAE TYPOGRAPHI.



PATRI SUO CARISSIMO,

HOC OPUSCULUM,

PIETATIS MONUMENTUM,

SACRUM VULT,

JACOBUS PEARSON SMITH.



CORRIGENDA.

P. I. L. 6. *post* ligamentis *dele* comma.

10. 13. *pro* *ad hoc lege* *ad hoc*.

17. 20. *pro* *et lege* *est*.

18. 16. *pro* *sana lege* *sano*.

21. *post* *sponte d.* comma.

19. 15. *pro* *non potuit lege* *non potuit*.

21. 6. *pro* *temporics lege* *temperics*.

23. 6. *ante ex adde* *ut*.

27. 5. *post* *corpus d.* *dum* *stimulat*.

31. 14. *pro* *generlis lege* *generalis*.

Mr Fullerton with
compts from the
Author.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

RHEUMATISMO ACUTO.

AUCTORE, JACOBO PEARSON SMITH.

FFECTIO, de quâ agitur, veteribus, quippe
agræ confusa, parum nota, nedum intellec-
videtur. Aretæus eandem *Arthritidis*, quâ
eralem omnium articulorum dolorem intel-
t, nomine descripsit: pedibus affectis, Pod-
n; coxarum ossibus seu ligamentis, tentatis,
iaden; manu laborante, Chiragram vocat*.

A

Romani

* De Causis Morb. Acutor. et Diuturn. lib. 2. cap.
p. 66.

Romani pariter scriptores rheumatismum p
dagræ ubique intermiscent; binas has affecti
nes generali *morbi articularis* nomine vocant.

Ballonius, medicus Parisiensis, rheumatismu
ab aliis vitiis, quæ machinæ humanæ junctur
præcipuè afficiunt, primus secrevit; idoneamq
instituit medendi rationem, quam medici pe
tiores, inter quos eminet Riverius et Sydenh
mus, exinde secuti sunt.

Cullenus autem celeberrimus nostram de h
re scientiam maximè emendavit, et auxit. Pr
cipua mali signa his verbis depingit.

“ Morbus ab externa, et plerumque eviden
“ causa; pyrexia; dolor circa articulos, m
“ culorum tractum sequens, genua et reliqu
“ majores, potius quam pedum vel manu
“ articulos, infestans, calore externo auctus.

“ Variat sede; hinc

“ In musculis coxendicis,

“ *Ischias Rheumaticum.*

“ In musculis thoracis

“ *Pleuritis Spuria.*

“ In musculis lumborum

“ *Lumbago* *.”

HISTORIA.

Nulla est forsan terræ plaga hoc malo penitus immunis ; in calidis autem et temperatis longè rarius quàm in frigidis invadit. Vere, tempestate frigidâ et præsertim pruinosa prægressâ, et autumno, haud ante verò quàm frigus incesse-rit, frequentissimè invadit : nec rarò hieme se ostendit ; imò interdum æstate etiam apparet. Morbi autem occasionem non tam ex anni tempestate, quàm ex cœli mutationibus, subitâ nimirum frigoris et caloris vicissitudine, pendere, hîc loci observandum est : hinc rheumatismus tempestatum effectus quodammodo videtur, quod eundem per diversas terræ regiones persequendo patebit.

Satis quidem de morbi frequentia in Europæ plagis ad septentriones vergentibus nobis constat :

* Synop. Nosol. Method. vol. 2. p. 118.

stat: eundemque in australibus quoque haud infrequentem esse crediderim; rem autem aliter se habere invenio.

Cel. Cleghornius de anni tempestate, quâ peripneumonia et pleuritis in Minorca invalent, agens, phrenitiden, anginam, aliasque inflammationes, memorat; rheumatismum autem silentio præterivit. Porro, ubi omnium morborum, quos in eadem insula per plures annos observavit, historiam tradit, rheumatismum semel tantum, idque leviter, perstrixit.

Terræ zonæ circulo æquinoctiali propiores clariora hujus rei argumenta præbent: cel. Hillary, in sua de Barbadae morbis historia, rheumatismum ibi interdum, rarissimè tamen, se ostendere narrat. De Aprile agens inquit “ This was
“ very dry and warm, but very sickly. There
“ were some inflammatory fevers, and also
“ some rheumatisms of the inflammatory kind;
“ though the last is not so frequent here as in
“ England *.” Eadem ferè alibi notat: “ We
“ also

* Diseases of Barbadoes, p. 41.

“also had,” inquit ille, “some inflammatory rheumatisms, which are more unusual in these warm climates †.” Hinc morbum, tempestate calida, calidisque regionibus, rariùs occurrere liquet.

Rheumatismus modò unam tantùm corporis partem, modò autem plures, rigore aliisque pyrexiaë indiciis, præsertim pulsu arteriarum frequente, pleno atque duro, prægressis, afficit. Pyrexiam ante interdum incipere, quàm partium dolores sentiuntur, quod contrà tamen plerumque evenit, observatio docuit.

Pyrexia existente, unus solùm articulus interdum dolore afficitur; si pyrexia gravior fuerit, res eodem modo se aliquando habet: rariùs tamen evenit, ut plures artus simul non afficiantur: hîc autem dolores sedem plerumque mutant, et in articulis, quos occupant, ante remittunt, quàm in aliis ingravescant: rariùs in eadem parte diu manent, articulatim sæpe volant; nec rarò ad partes antea plexas redeunt. Malum sic aliquandiu persistat.

Dolores

† Diseases of Barbadoes, p. 109.

Dolores noctu graviores, comitante simul pyrexia, fiunt; sedemque sæpius mutant. Dolorum acerbitas accessioni nocturnæ, quæ in ple-
risque affectionibus observatur, tribuenda vide-
tur. Doloris magnitudo pyrexia, quippe illum
semper augenti, pro ratâ respondet.

Rubor et tumor plus minus notabiles dolor-
que tactu auctus, artubus aliquandiu affectis su-
perveniunt. Dolor tumore sæpe levatur; non
autem penitus tollitur. Articuli tumorem, do-
lore nondum exorto, interdum supervenire ad-
ducor ut credam. Hoc occasio mihi observandi
semel fuit, in qua tumor duas ante horas planè
incepit, quàm dolor vel minimus perciperetur,
neque ulla unquam injuria unde tumor oriri
potuît, articulo illata fuerat.

Sudor, morbo haud multùm provecto, pro-
rumpere solet: idem verò, quippe neque liber
neque copiosus, articulorum dolores non tollit,
neque morbum solvit.

Progrediente malo, urina colore rubicundiore
est; nihil autem ferè deponit, donec pyrexia
insigniter remiserit; ubi fæx lateritia vasis fun-
dum

dum ac latera petit; nullam verò indè malum crisin habet: diu enim postea perstat.

Sanguis e vena hoc morbo laborantibus missus crustam tenacem albidam habet: quoties sanguinis fibra eò usque contrahitur, ut crassamenti superficies cava, seu pyxidata, fiat, diathesin phlogisticam maximam esse judicamus. Cel. Rutherford, glutinis contractionem hîc minorem quàm in pleuritide esse credit.

Rheumatismus acutus cæteris licèt phlegmatis fatis affinis, hoc tamen, quod in suppurationem minimè proclivis est, ab eisdem insigniter distat: quod affectionis sedi, articulorum, putà, ligamentis atque tendinibus rectè tribuitur. In aliis quoque partibus malum sedem haud rarò figit; illarum præcipuæ sunt fasciæ musculorum tendineæ, *pericranium*, membranæ oculi, *sclerotica* scilicet, aurium etiam, et thoracis, pleura, nimirum, quæ rariùs suppurant. Si suppuratio quidem fiat, pessimi generis plerumque est, quod peculiari inflammationis naturæ ex parte tribuatur oportet. Hæc quidem inflammatio, humore peculiari viscido, et pellucido, in tendinum the-

cas effuso, qui bono pure longè discrepat, tumorumque causa existit, ferè semper insignitur. Latex iste modò reforbetur, modò articuli adeo eodem tument, ut partem incidendo exinaniatur necesse fiat; hîc ulcus sanatu difficillimum exoritur. Tumor nunquam, si fieri potest, incidatur. Hunc inter et phlegmonem hoc interest, quòd ille nunquam in gangrænam, hic verò non item, si persistiterit diutius, abit.

Rheumatismus acutus plures sæpe hebdomadas durare solet: exitium rarissimè offert: pyrexia rarò ultra secundam vel tertiam septimanam gravis persistat; neque citiùs inclinatur, quàm artuum dolores remittunt, sedique suæ firmiùs inhærent.

CAUSÆ REMOTÆ.

Rheumatismus nulli parcit ætati. Mortales verò jam inde a pubertate ad annum quadragimum usque plerumque adoritur: rarò enim infantes aut ætate provectiores incessit; senum
tamen

tamen, quos acutior mali forma sæviùs exercuit, exempla subinde occurrunt.

Homines temperaturâ corporis sanguineâ præditi eidem opportuniores existunt.

Malum ex vitio hæreditario nasci verisimile videtur; plures enim stirpe oriundi eâdem sæpe affici videmus.

Impetus morbi sæpius prægressi insigni in proclivitate danda vi pollere jure habentur.

Frigus corpori præter solitum calenti admodum rheumatismum acutum plerumque concitat; quandove aliqua corporis pars gelido flabro objicitur; dum cæteræ calent; vel denique, quoties frigus diutiùs in corpus agit; quod, vestibis humidis, interdum fit; morbus præ ingenti algoris gradu, inter humorem vaporandum, genito excitatur.

His causis corporis plenitudo, ver, autumnus, frigus hydrargyro utentibus collectum, et ex regione frigida in calidiorem migratio, annumeranda sunt.

D I A G N O S I S.

Rheumatismus et podagra ob fedis communitatem, et signorum similitudinem difficiliùs dignoscuntur: eorum autem curatio haud parum diffidet, imo sæpe contraria est: de discrimine igitur ante constat necesse est, quàm remedia adhibeantur. Pleraque morbi aliquantum pro-
vecti exempla facile plerumque secernuntur; ejusdem autem ineuntis differentiam non solum difficilem, sed curationem etiam omnino diversam esse, periti bene norunt. Rheumatismus, aliorum morborum instar, nullo signo peculiari dignosci potest: ad hoc plurium indiciorum concursu opus est: hinc igitur, ut in aliis affectionibus consimilibus fieri solet, cuncta utriusque mali signi cæteræque res accuratiùs componantur necesse est. His principiis positis rem sic aggredimur.

1^{mo}. Rheumatismus frigore ferè semper concitatur, podagra verò ex hac causa rariùs oritur; hæc est hæreditaria, illa rarò.

2do. Podagra sine causa externa, aut manifesta, oritur; prægressâ plerumque insolitâ ventriculi affectione, plura, nimirum, dyspepsiæ indicia, qualia sunt cibi fastidium, nausea ructusque acidi, aut nidorem reddentes, quæ res plures dies perstare solent, et tandem brevi ante podagræ impetum decedunt, ubi cibi desiderium præter solitum acuitur: res autem in rheumatismo nunquam ita se habent.

3tio. Rheumatismus morbi sede a podagra aliquatenus secerni potest: ille plures simul articulos, genua, putà, et reliquos majores potiùs quàm pedum aut manuum juncturas infestat, et musculorum cursum sequi solet; hic autem unum primò articulum, et plerumque pedis pollicem, aut manuum pedumve juncturas corripit; certis intervallis rediturus, articulosque et partes corporis internas alternis vicibus haud rarò exercet. Rheumatismus effectus suos latiùs in corpus diffundit; hoc autem rariùs fit in podagra, quæ sæpe ex uno pede ad alterum tantùm transvolat; nec ambos simul pedes graviter torquet; aliquando verò, ut supra diximus,

podagra

podagra ad ventriculum, aliasve partes internas migrat.

Rheumaticis aliquis, præ cæteris, articulus vehementiùs ferè semper dolet : interdum verò quæ junctura sæviùs excrucietur æger dicere non potest. Dolores rheumatici humeros, cubitos, carpos, genua, atque malleolos præcipuè forsitan afficiunt, rariùs autem suam in digitorum manuum, aut pedum, juncturis sedem figunt. Podagra cunctos corporis articulos afficere potest : hoc autem rariùs quidem evenit : ex 100 enim ægris 80 de manus pollicis, aliufve digiti, et plures etiam, 99 scilicet, de pedis pollicis dolore, podagra obrepente, primò conqueri, observatione constat.

Ischias rheumatica difficile quidem a podagra coxendicem torquente internoscitur : in illa autem dolores coxâ solâ contenti non sunt ; nam deorsum secundum femur diffusi genu sæviùs infestant, indeque vibrati malleolum petunt, unde magno dolore emicant : podagra autem coxam afficiens rariùs in istas juncturas transvolare observatur. Hoc cel. Cullenus voluisse videtur,

detur, ubi rheumatismi characterem insigniens inquit, “ *Dolor circa articulos musculorum tra-*
“ *etum sequens,*” qui in podagra limitibus multò arctioribus coerceri solet.

4to. Rheumatismum semel tantum in vitæ decursu aliquem afficere, sæpe observatum fuit: podagra autem plùs minùsve ferè semper revertitur: quos semel enim corripuerit, hi iteratas tentationes eâdem ferè tempestate redituras jure expectant: rheumatismus autem nulla certa aut definita redeundi tempora observat; hoc enim causis externis agentibus omnino pendet.

5to. Quàmvis podagra post intervalla satis quidem definita redire soleat; hoc tamen minimè vere aut autumno semper fit: nonnullos enim exeunte ferè æstate sæpiùs fatigat: istuc autem rarius fieri, intervallaque reditûs satis esse certa, fateamur oportet: hujusmodi autem rheumatismi stabilitas rara est.

Podagra mortales annum ante quadragesimum quintum rarò adoritur; rheumatismus autem acutus a pubertate ad annum trigessimum quintum, aut quadragesimum, invadere solet.

Rheu-

Rheumatismus acutus a syphilide et scorbuto, animum ad indices harum affectionum proprios advertendo nullo ferè negotio dignosci potest.

Syphilide laborantibus, ossa media et durissima, rheumatismo autem acuto affectis, articuli et extrema ossa, dolent: præterea, ubi dolores a lue venerea pendent; alii hujus mali indices, bubones nimirum, tonsillarum ulcera, cutis, præsertim ad *capillitii* marginem, papulæ corymbosæ in crustas et in ulcera crustosa abeuntes, nodi, *tophi*, et *exostoses*, præeunt, vel comitantur; et denique pars tactu non dolet; quod in rheumatismo acuto semper fieri observatur.

Qui rheumatismum scorbuto confundunt, rei nosologicæ admodum rudes sint necesse est: causæ remotæ, diæta, nimirum putrida, et præsertim carnes sale nimio conditæ, asthenia, stomacace, maculæ livescences ad pilorum radices et lassitudo spontanea, quæ res rheumatismi comites nunquam existunt, binas has affectiones facile separant.

Pleuritis spuria pneumoniæ intermisceri potest; curam autem sequentibus indiciis intendendo

dendo haud difficile distingui queunt; in illa enim pars externa tactu dolet, et interdum tumore et rubore plùs minùsve afficitur; porro nulla plerumque tussis adest, vel si hæc se comitem jungat, sicca manet: hæc autem signa rheumatismo acuto non sunt.

Arthrodynia, a rheumatismo acuto nullo plerumque negotio dignosci potest: illa enim hujus effectus non rarò existit; nec ullam pyrexiam aut tumorem plerumque comites habet; artusque rigidi et debiles sunt, sæpe sponte frigescent, doloresque eorum sub motu præsertim augentur, et calore mitigari solent: quæ omnia rheumatismi acuti indiciis longe distant.

Lumbago nephritidi quoque confundi potest; hæc autem nausæâ, vomitu, dolore ureteris iter sequente, cruris stupore, testibus dolentibus et sursum tractis, et urinâ limpidâ vel sanguineâ sæpius redditâ ab illa, quæ nullos ferè hujusmodi indices habet, facile internoscitur.

CAUSA PROXIMA.

Nulla est forsan medicinæ pars, quæ atriore nocte premitur, quàm causæ morborum proxima: hanc igitur argumenti partem leviter tantum, et obiter mihi libare fas fit. Clar. Boerhaave sanguinis lentorem proximam non solum rheumatismi acuti, sed aliarum pariter inflammationum, causam esse posuit. Cel. Cullenus hanc sententiam convulsit; aliamque, quæ ipsi verisimilior visa est, in medium protulit: arteriarum extremarum debilitatem et spasmus sanguinis cursui ita obstare, ut vasorum impetus non solum partibus inflammatis, sed etiam toti corpori necessariè intendatur; indeque naturam, quò malo occurratur, pyrexiam, vasorum spasmum solvendi, congestumque tollendi, causa concitare, fibrasque musculosas rigidas simul fieri, opinatus est. Alii Culleni sententiam, spasmo omisso, amplexi, arteriarum extremarum debilitatem pro causa inflammationis proxima habent: indeque omnium indiciorum rationem feliciter reddi

reddi posse contendunt. Medicinæ autem rudes sint oportet, qui hujusmodi ineptiis acquiescunt. Qualiscunque enim fuerit causa proxima, seu illa partis inflammatae conditio unde phænomena pendent, illam neque semper in debilitate, neque in nimio vasorum robore, ut alii docent, consistere manifestum est. Alia enim rheumatismi acuti exempla roborantibus, cinchona nimirum, ut cel. Saunders docet; alia verò remediis contrariis, quæ, scilicet, insigniter in vi cordis et arteriarum minuendâ pollent, optimè fasantur.

PROGNOSIS.

Rheumatismus periculum rarò conflat, nisi ad partes corporis interiores, caput, putà, ventriculum, aliave viscera, transvolat: hîc quidem horrendos effectus interdum edit: quamvis autem ægrum rariùs plerumque in periculum adducit; omnium tamen fere phlegmasiarum, nulla et forsan, quæ difficiliùs curatur, diutiùsve persistat. Ex doloris violentia numeroque articu-

lorum affecto periculum judicamus. Quoties latus, aut abdomen afficitur, periculi plus adfert: tunc enim in pleuram, et ipsum etiam pulmonem diffundi potest. Cachexiæ, hydrops, putà, arthrodynia, paralyfis, anchylosis, aliaque mala, nimiâ sanguinis detractiōe, cæterâque curatione *antiphlogisticâ* strictiùs observatâ, rheumaticis conflari solent.

Cùm malum articulorum majorum, genu, nimirum, cubiti, et malleoli, ligamenta, non rarò occupat, ab hydarthro studiosè caveri debet.

Rheumatismo acuto nascenti facilè medetur; inveterato non item, præsertim ubi vires fractæ fuerint: de horum mali exemplorum eventu cautè judicandum. Quando morbus ætate florenti, cæteraque sana incessit, exitum faustum, modò medicina idonea tempestivè adhibeatur, præfagire fas est. Dolor, morbo inveterato, eadem parti pertinaciter hærens, malum est.

Aliqua exinanitio velut fudor tepidus et copiosus, five arte moveatur, five sponte, prorumpat, in totum corpus diffusus, in justum tempus, 24 aut saltem 12 horas persistans, somni, cibique
appetentiæ,

appetentiæ, reditus, signorum simul remissio, diarrhœa etiam, aut hæmorrhagiæ spontaneæ, et denique *erythema*, sunt boni ominis indicia.

Terminatio rheumatismi acuti frequentissima est resolutio: rarò quidem in suppurationem, perrarò in gangrænam, aut schirrum, abit. At nihilo minùs tamen cel. Storck rheumatismum acutum satis sæpe in suppurationem terminari planè confirmat; pluraque hujus terminationis exempla in opusculo, quod Annus Medicus inscribitur, publici juris fecit: magna puris vis ex tumoribus apertis exhibat: ulceraque sanatu difficillima erant: de his scribit, “ Longo tempore diversa remedia tentavit dominus Haffner, optatam tamen metam attingere non potuit.”

Cel. denique Morgagni lumbaginis exemplum narrat, in quo muscoli, quadratus lumborum, et sacro lumbalis mirum in modum laxi, et flexiles evaserunt, et colorem subfuscum induerunt*.

RA.

* De Sed. et Caus. Morb. Epist. 57. p. 17.

RATIO MEDENDI:

Rheumatismi acuti naturâ, et præcipite in arthrodyniam proclivitate, perpenſis, præcipua medendi conſilia duo ſequentia eſſe, maniſeſtum eſt; nimirum.

1^{um}. Diatheſin totius corporis, et præcipuè articulorum, phlogiſticam, tollere.

2^{dum}. Arthrodyniæ occurrere.

Remedia primo conſilio accommodata, ſunt omnia, quæ nimiam cordis et arteriarum vim atque tentiõnem ſatis minuunt; qualia ſunt regimen *antiphlogiſticum*, ſanguinis detractio, alvi purgatio, et ſudorem moventia: de quibus ſigillatim paucis jam agetur.

Regimen *antiphlogiſticum*, in quâ voce omnium irritationum, quæ, machinæ humanæ ferè ſemper admoventur, imminutionem, aut evitiõnem ſignificamus, per totum ferè morbi curſum neceſſarium eſt: harum irritationum præcipuæ ſunt calor, diætã, cibi præſertim ex carnibus parati, potuſque validi, vinum nimirum, ejusque

ejusque spiritus, animi corporisque exercitatio, lux, strepitus, aliaque bene multa. Harum rerum vis, pro signorum violentia, minuenda, seu vitanda est. Cubiculi, igitur, in quo rheumaticus decumbit, calor modicus sit oportet: media forsan cæli temporis votis optimè respondebit. Diæta ferè nulla concedatur, dum diathesis phlogistica urget, præter ptisanam, aut lactis ferum; quod Sydenham plurimi fecit, et ad morbum debellandum haud parum conferre posuit. Illic quidem potus corpus modicè alit, et refrigerat, sitim restinguit, alvum leniter solvit, vires haud parum reficit; cæteris igitur omnibus anteponendus videtur. Cibi ex carnibus parati, omnesque liquores meraci, quales supra memoravimus, quippe qui corporis calorem, totiusque generis nervosi actionem, ultra modum, intendunt, cautissimè fugiendi sunt; horum vicem diæta mitis, blanda, et refrigerans, ex imbecilla materia parata, fruges, nimirum, subacidæ, faraceæ, et glutinosæ, uvæ, scilicet, fraga, aurantia, panis bene fermentatus, *sago*, aliaque, id genus, reddant. Cura simul, adhiberi debet, ne ventriculus

ventriculus cruditate gravetur, aut alvi pigritia adsit, quæ res inflammatione laborantibus haud parum molestiæ afferunt : his vomitoria, medicamenta cathartica, et *enemata* mitiora optimè occurrunt.

Quamvis regimen jam descriptum rheumatismo acuto affectis prorsus necessarium sit ; consilium tamen, de quo agitur, copiosâ et tempestivâ sanguinis detractiōe, alviq̃ue purgatione potissimum absolvitur. Quòd sanguinis copiam simul detrahendam attinet ; nulla quidem præcepta generalia tradi possunt : hæc res ægri viribus, ætate, sexu, corporis habitu, artuum dolore, arteriarum percussu, et frequentiore aut rariore hujus exinanitionis usu, dirigatur oportet.

Rheumatici adulti, pleni, atque validi, uncias sanguinis quatuordecim, aut etiam sedecim, simul missas impunè ferre solent. Multis hujusmodi exemplis una tantum sanguinis detractio non rarò fatis est ; non desunt tamen, quibus altera, vel etiam tertia, primo morbi triduo se vertente, necessaria est. Nec ulla forsan existit inflammatio,

inflammatio, si *pneumoniam* excipias, quæ hanc exinanitionem impuniùs fert. Riverius et clar. eques Pringle iteratas sanguinis detractiones hujus mali fanatione enixè commendant; ille de hoc remedio sic loquitur. “ Quandoquidem hic
“ morbus hoc habet peculiare; ex frequente venæsectione vires non deſiciantur, ſicut in aliis
“ morbis ſolet contingere :” hic etiam in eâdem eſt ſententia; rheumaticos enim, meliùs quam quâvis aliâ inflammatione affectos, ſanguinis jacturam tolerare aſſerit.

Rheumatici autem ætate provecti, habituve corporis delicato præditi, ſanguinis detractionem copioſam aut iteratam ægriùs ferunt. Hujusmodi igitur ægris humor vitalis cautè et cogitatè detrahatur neceſſe eſt : quis autem modus ſit, haud facile dixeris; Profeſſor Gregory debiles quosdam rheumaticos regimine *antiphlogiſtico*, ſanguine ex partibus dolentibus miſſo, ſudoreque moto, ſanatum in opinatus, ad generalem ſanguinis detractionem, quam initio ſupervacuam habuit, confugere non rarò coactus fuit.

Hic loci sanguinis detractionem, quò velociùs e vena effluxerit, eò magis ad diathesin phlogisticam tollendam valere, notandum est; ex ostio igitur amplo mittatur oportet.

Quamvis autem sanguinis detractio cæteris remediis longe præstet, eandem tamen ultra modum adhibitam pessimos effectus, summam nimirum corporis debilitatem, *arthrodyniam*, durum hydropem, certissimum sanguinis nimii detracti indicium, aliasque affectiones ex virium defectu pendentes, edere, nunquam e medici memoria excidere debet.

Iustâ sanguinis copiâ e brachio misâ exinactiones e partibus dolentibus, præsertim postquam hæ tumuerint, insigni beneficio fiunt: parti dolenti multum, totique etiam corpori, non nihil solatii, præbent: diathesis enim phlogistica generalis ex partis inflammatione penitus licet non pendeat; inde tamen haud parum intendatur necesse est: nihil amplius autem plerumque quàm partis affectæ levamen afferunt: quoties enim diathesis phlogistica generalis est, dolores, sanguis licet e parte dolente copiosè detrahatur, nocte

nocte insequente in vicinis articulis, inde, dum diathesis generalis fatis minuatur, migraturi, plerumque reperiuntur: pyrexia igitur generali fatis minutâ, saevisque doloribus, uno præsertim parti pertinaciter haerentibus, sanguis ex hac detractus, quod hirudinibus, aut cucurbitulis cum ferro, fieri potest, magnum levamen affert.

Alia porro auxilia partibus dolentibus ad-
mota, tepidarii scilicet usus, et fomenta, malum, saeviente generali diathesi phlogistica, plus au-
gent, quàm diminuunt: hâc autem sublatâ, pro-
desse queunt. Rubefacientia, oleum scilicet
ammoniatum aut *camphoratum*, plus mali quàm
boni afferunt: corpus plus minùsve calefaciunt,
et irritant, efficiuntque, ut inflammatio articula-
tim certius transvolet; et *vesicatoriis*, quae do-
lores longè efficacius depellunt, jure locum
dant.

Alvi purgatio quoque nimiae cordis et arteri-
arum vi tollendae optimè accommodata videtur:
cathartica mitia et refrigerantia, tartari nimirum
cristalli, *seda tartarisata*, *seda phosphorata*, et

potassa tartarifata, caeteris anteponenda sunt : haec autem exinanitio omni hujus affectionis exemplo minimè congruit : pyrexia enim, faevisque articulorum doloribus, urgentibus, ubi nullus ferè corporis motus sine magno dolore, et frigus ab aëre, cui aeger, inter surgendum, objicitur, colligendi periculo, fieri potest, revera nocet : alvi igitur durities, haud infrequens hujus mali comes, *enematibus* mitioribus, prout signa postulaverint, iteratis, levanda est. Cathartica mitiora, manna, tamarindi fructus, tartari crysalli, aliaque leniora, ubi *enemata* spem fallunt, commodè dari solent.

Sudorem autem moventia, diathesi phlogistica remediis supra dictis satis minutâ, sunt auxilia, quae votis optimè respondent : omnia ferè hujus classis medicamenta diversis temporibus tentata fuerunt. In Gallia illud antimonii praeparatum, quod *kermes minerale* olim audire solebat, in maximo pretio habetur ; apud nos verò rarissimè usurpatur : pulvisque ipecacuanhae compositus ob magnam, quam rheumaticis affert, utilitatem, jure anteponitur. Opium præ caeteris omnibus

nibus medicamentis sudorem movere inter omnes jam medicos constat : idemque cordi et arteriis stimulo esse satis quidem verisimile est : insigni tamen sedandi vi, stimulatrici contrariâ, quæ corpus dum stimulat, simul laxat, et plus vascula extrema, quàm cor et arterias, afficit, præditum est. Hinc sudor faciliùs et minore vaporum impetu movetur, quàm alioquin possibile foret : opium igitur, mirificas has ejus qualitates obtinendi causa, cum sale neutrali et vomitorio, quippe in extrema corporis vasa, ut omnes novimus, agentibus, illiusque vires eòdem certius diffundentibus, commodè conjungi potest. Hujusmodi sanè compositio, (qualis est pulvis ipecacuanhæ compositus,) sudori efficacius movendo idonea mihi videtur. Sudor longè commodiùs diu quàm noctu cietur : pulvis igitur sudatorius summo mane, ubi æger somno reficitur, peritiùs datur ; cùmque sudor quam lenissimè cieri debet, magnaue dosis vomitione, quam movere solet, rejici periclitatur ; parva tantùm, ad grana, nimirum sex, octo, vel decem, boli formâ, et etiam

tiam crustulo interdum involuta, ne nauscam faciat, alterâ quâque horâ, dum sudor prorumpat, detur oportet: sudatio per totum diem, et in nonnullis exemplis per totam noctem infrequentem, iisdem ferè medicamenti dosibus, longioribus tamen, prout res postulaverint, intervallis, perpetuari debet. Si æger pulverem fastidit, ut interdum fit; haustus ex opii tincturæ et vini antimonii tartarifati; aut hujus vice, ex ipecacuanhæ tincturæ, singulorum scrupulo paratus, in illius locum substitui potest.

Sudor, nisi ex omni corporis parte manet, spem nostram fallit; partibus corporis superioribus, capiti scilicet, collo, ac pectori, facilè, ægrius autem inferioribus, præsertim pedibus, citari solet; si in hos igitur non diffundatur, utres aquâ calidâ repleti, lateres calefacti, aliave fomenta calida, statim admoveantur necesse est. Rheumatici subinde occurrunt, quibus sudor remediis jam dictis difficillimè movetur; his, modò ante in tepidarium descendant, quàm medicamenta sudatoria dentur, sudor cæteroqui nullus, aut parvus, facilè sæpe movetur.

Ante verò quàm pulvis affumatur, æger indusiis linteis exutis, stragulis laneis, quæ sudorem absorbent, ac retinent, involutus decumbat: lintea enim brevi madida fiunt, et frigus insigne, quod sudorem reprimat, nunquam non gignunt.

Nullus ægro potus detur, donec sudor prorumpere inceperit, ne medicamentum sudatorium, vomitione motâ rejiciatur. Ut primùm cutis maduerit, diluentia tepida, primò modicè, postea liberius, ita tamen ut ventriculus nimiam copiâ non gravetur, administrentur: huic consilio serum lactis, et alia quæ corpus minimè stimulant aut calefaciunt optimè respondebunt: nonnullis ægris serum vinosum subinde concedi debet. Haustus, ex *citritis potassæ* uncia, opii tincturæ, et vini ipecacuanhæ, singulorum, scrupulo, factus, omni nocte tertiâ quâque horâ sumptus, haud parum ad sudationem promovendam confert.

Tempus quod sudor manere debet ex ægri viribus, et dolorum levamine pendebit; in plerisque autem exemplis in horas plùs minùs tri-

ginta protrahatur oportet: sudorem autem nimio calore, five cubiculi, five stragulorum, five medicamentorum, elicited, admodum periculofum effe, et frigus non inter fudandum modò, fed etiam aliquandiu poft fudationem finitam compluribus, exitium attuliffe, nunquam oblivifcendum eft.

Morbo inclinato, animum ad fecundum mendedi confilium, *arthrodyniæ*, nempe, *occurrere*, intendamus oportet; cinchona officinalis hîc, reftante cel. Saunders, votis optimè refpondet: non folum enim pyrexiam leviozem reddit, fed peffimis rheumatifmi acuti effectibus, articulorum nimirum debilitati, rigiditati, et paralyfi, quæ aliquando fupervenit, feliciter occurrit. *

Morbo his remediis fublato, magna tamen in arthrodyniam proclivitas etiamnum exiftit; cui caufarum occasionalium evitacione, corporis exercitacione, perito frigidarii ufu, et idonea

* Observations on the Red Peruvian Bark in the Cure of Agues and Fevers.

nea diæta occurratur oportet. Nulla caufarum excitantium magis timenda quam frigus; vestes igitur idoneæ, præsertim indusium laneum parentur, articuli que qui vim morbi passi sunt, lanulâ involvantur: cùm primum valetudo, et præsertim artuum conditio permiserint, æger equo sub jove ficco, quotidie vehatur, et frigidario per plures septimanas utatur. Diæta blanda levis et concoctu facilis, ex farraceis et lacte præcipuè parata, in unam alteramve septimanam continuata, a Sydenhamo non parum commendatur: præcepta autem diætetica pro varia ægrorum consuetudine, varientur necesse est. Quoad diætam igitur nulla regula generalis tradi potest.

Quantamvis autem huic consilio, arthrodyniæ, nimirum, prævertendæ, curam impenderis, ea est tamen quorundam ægrorum in eandem proclivitas, ut vix aut ne vix quidem arceri possit.

Alia ab aliis arthrodyniæ sanatione remedia commendantur, rubefacientia, oleum nimirum ammoniatum, aut camphoratum, sinapismi, ac fomenta

menta calida, identidem profuerunt. Cel. Darwin hydrargyrum muriatum mite opio conjunctum in magno pretio habet: viri clari Cheyne et Pitcairn oleum terebinthinæ. Stimulum fanè valde diffusilem, magnis laudibus efferunt: auxiliis autem externis, indusio scilicet laneo, lanulæ, villisque, forsan partibus affectis, admotis, potissimum fidendum. His suppetias ferent frictio variis modis, strigilè, seu panno laneo, effecta, frigidarium, et tepidarium: Quod si hoc totum corpus laxando debilitatem infert, aqua calida partibus dolentibus rigidis et debilitatis per antliam exiguam, quod Bathoniæ, et Bucosteni factitari videmus, affusa proderit. Totius corporis, et præsertim partium affectarum, exercitatio, et scintillæ electricæ ex his aliquandiu quotidie elicitiæ, haud parum juvabunt.

Multi olei jecinoris aselli semunciam, frumenti spiritus pauxillo admistam, unaquâque nocte aliquandiu datam, insigne hoc malo laborantibus solatium, sudorem copiosius ciendo, sæpe attulisse credunt.

F I N I S.

So X

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

P H T H I S I.



DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

P H T H I S I;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu, et

Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto;

PRO

GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

GULIELMUS PITTS DIMSDALE,

ANGLUS,

SOCIET. REG. MED. EDIN.

SOC. EXTRAORD.

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT ADAMUS NEILL ET SOCII.

M DCC XCIX.

DANIELI RUTHERFORD, M. D.

IN

ACADEMIA EDINENSI

BOTANICES

PROFESSORI,

HOC TENTAMEN

SUMMÆ OBSERVANTIÆ

TESTIMONIUM

DICAT

AUCTOR.

Chas. T. Sullivan
from the Author

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

P H T H I S I.

MORBUS de quo dicturus sum attentionem medicorum semper sibi vindicavit; etiam si operam haud exiguam in hujus natura et curatione investigandis viri clarissimi collocaverint, fatendum tamen est, nullum omnino dari, ne peste ipsa excepta, qui sit hominibus infestior, omnemque medicinam magis contemnat.

Phthisis sic a CULLENO definitur : “ Corporis emaciatio et debilitas ; cum tussi, febre hectica, et plerumque expectoratione purulenta.”

Tussis sæpe quidem ab initio ita mitis est, ut vix animadvertatur, et ab ipso ægrotante ejusque familiaribus a catarrho oriunda judicetur ; interea vero vires acquirit eundo, sæpissimèque fit molestissima antequam ad eam sistendam, malosque frigoris effectus avertendos, ferio se accingunt. Exscretio quæ primo morbi ingressu parca erat, eodem invalescente fit copiosior ; neque jam ut olim, perlucens glutinosusque mucus expuitur, sed opaca, friabilis, purulenta denique materies, quæ, eheu ! apertè nimis quo morbus tendat ostendit.

Variis modis usi sunt clinici, quò quid intersit discriminis mucum inter et pus in medium proferrent ; non deficiunt certè suæ laudes experimentis quæ de hâc re instituit ingeniosus

niosus vir CAR. DARWIN, magis vero obvia HIPPOCRATIS methodus, quæ a specifico istor^{um} fluidorum pondere petitur, nuncque frequentius usurpatur : pus etiam fœtore suo commodè a muco distingui potest.

Brevissimo tempore post morbi exordium, comitum habet hæcticam febrem ; hujus vero historia tam minutatim et eleganter a CULLENO describitur, ut longè satius fuisse mihi videar si ipsius verba referam. “ A hæctic fever has the form of a remittent, which has exacerbations twice every day. The first of these occurs about noon, sometimes a little sooner or later ; and a slight remission of it happens about five afternoon. This is soon succeeded by another exacerbation, gradually increasing, till after midnight ; but, after two o’clock of the morning, a remission takes place, which becomes more and more considerable as the morning advances. The ex-
acerbations

acerbations are frequently attended with some degree of cold shivering, or, at least, the patient is exceedingly sensible to any coolness of the air, seeks external heat, and often complains of a sense of cold, when, to the thermometer, his skin is preternaturally warm. Of these exacerbations, that of the evening is always the most considerable."

Febris illa, auctore CULLENO, ortum suum habet a peculiari quâdam acrimonia; quæ ipsa ab ulceribus est oriunda; hujus vero acrimoniæ natura nos penitus latet, interea vero, quotidiana nos docet experientia ulcera diutius adeste, imo etiam ingentem vim puris in venas reforberi, quin ulla hæctica febris oriatur; id etiam in professo est, sæpissime adeste febrem hæcticam, quin ulla puris vel levissima particula detegi possit: facile assentimur CULLENO, cum docet, positâ illâ acrimoniâ priorum

priorum huic morbo signorum rationem in promptu esse; sed ut illustrissimi cujusdam scriptoris verbis utar: “Supposer ce qu’on ne voit pas, croire ce qui est contredit par l’expérience, c’est substituer des songes à des objets réels, c’est embrasser l’erreur pour la vérité, et adopter des chimères pour des faits.”

Non longô post febris hæc sese prodiderit, copiosius plerumque profluunt sudores, præfertim qui vespertinas exacerbationes excipiunt; morboque incrementa capiente, iidem immanes evadunt; urina vero parcior redditur, et coloratior, et non exiguam sedimenti vim deponit; multa exempla extra dubii aleam posuerunt, mirabile inter eas quæ per cutem et quæ per renes fiunt excretiones adesse æquilibrium; ita ut si parciore illæ, hæc copiosiores evadant; sic diabetes cutem aridam caloremque imprimis ad volas manuum

num et pedum urentem habet, omniaque symptomata vix ullum sudori exitum patere ostendunt : coloratio urina, salibus non ut decet dilutis, omnino tribuenda est ; non tantum medici nostris temporibus huic urinæ conditioni confidunt, quantum majores confisi essent ; interque aniles fabulas hodiedum numeratur eorum opinio, qui reliquias morbi cum sedimento deponi arbitrabantur ; verum enimvero, probe novimus, eò coloratiorem plerumque urinam esse futuram, quò parcior sit ejusdem copia.

Arida lingua immanisque fitis hanc febrem rariùs stipantur ; aphthæ quæ aliquando in ore erumpunt, vix ullam salutis spem habent : pallida plerumque est facies, exacerbescente vero febri genæ leviter seu hecticè rubescunt. Adnata oculorum membrana albidum margaritarum colorem refert ; uno verbo, tota oris forma emorientes ægrotantis vires ostendit,
non

non vero eventus terrore depressum animum ; spem enim alit æger, vel morbo ad exitium properante ; sibi que blandicus paucis nonnunquam horis antequam mors finem miserrimæ vitæ imponit, de futuris cum amico colloquitur.

Alvus à primo morbi ingressu est plerumque pertinaciter adstricta, febre vero ingravescente præter modum fit laxa ; neque sibi est constans alvi fluxus, solummodo per intervalla redit ; observaverunt clinici eo parciore fieri sudores, quò fit immanior diarrhœa.

Primas omnino tenet inter varia morbi symptomata corporis extenuatio et macies ; quæ quidem aliquando tanta fit, ut ossa solâ cute tecta appareant. Capilli defluunt ; ungues incurvantur ; lethale signum dixit HIPPOCRATES si capilli et alvus simul defluant. In fœminis cum aliquandiu morbus perstitit, menstrua

menstrua fluere prorsus desinunt ; hunc morbi effectum, mulierculæ plerumque ejusdem esse causam arbitrantur. Morbo jam provento, maximus adest virium lapsus ; œdematosus fit æger, imprimisque intumescunt pedes, atrocior est diarrhœa, parcior vero sudor, delinquit animus, delira et absona nonnunquam effutiuntur, mors tandem tragædiam absolvit.

C A U S Æ.

INTER causas quæ corpus huic morbo opportunum faciunt, primas manifestò sibi vindicat scrophulosa indoles quæ à parentibus ad prolem transmittitur ; hujus vero indolis natura nos penitus latet, suos effectus præcipuè in systemate lymphatico obvios habet, et vix unquam strumosos tumores in aliqua corporis parte

parte reperies, quin etiam tubereulis pulmones inficiantur; hic nexus quo tuberculæ alique strumosi tumores inter se connectuntur, plurimorum scriptorum attentionem sibi vindicavit; et a GREGORIO nostro, in aureo suo quem de morbis cœli mutatione medendis in lucem edidit, libello sic deferibitur.

“ Eandem speciem externam, et, si eultro ineiduntur, internam habent; eandemque spissitatem et duritiem: eodem modo, a parvo initio ad molem sæpe magnam paulatim creseunt, et plerumque sine magno dolore aut molestiâ; tardè et ægrè suppurant, et nunquam in suppurationem benignam abeunt, sed uleera fœda et vix sanabilia relinquunt. Eodem anni tempore ambo se ostendunt, hiemali scilicet aut verno; accedente æstate, levantur, aut dissipantur, at, reverso hieme ambo sæpe redeunt. Denique in sectionibus cadaverum

corum quos scrophula plane occidit, tumores scrophulofi in omnibus corporis partibus, et tubercula in pulmonibus ejusdem speciei, haud raro reperiuntur.”

Si quis vero auctore BEDDOES urgeat nos hujusmodi naturam non exposuisse cum illum ad scrophulas retulimus, si quidem ipsa scrophularum natura sit in obscuro ; fatentes reos habebit, verum enimvero cum hujus rei notitia tantis undique prematur difficultatibus, fatius sanè est nostram ignorantiam plane agnoscere, quam vanis indulgere commentis quorum probatio à paucis tantum rebus factis petitur, quarum ratio melior longèque planior alia reddi posset : non tamen omnino rejiciendæ mihi videntur hujusmodi investigationes, sic enim scientia nostra adornatur locupletaturque, sic medicus ab empirico distinguitur ; hoc vero semper memoriâ tenendum est, non conjectando

do

do naturæ arcana esse detegenda : non tantum certe esset medicinæ opprobrium, neque tot tamque absurda detegerentur in medicis lucubrationibus, quæ ab HIPPOCRATIS tempore ad nostrum usque diem exaratae fuerunt, si ad res solas factas et veras investigandas semet medici gnaviter accinxissent.

Catarrhus qui in primis apud nostrates frequentissimus reperitur, phthisin sæpius procreavisse existimabatur, immerito quidem; nisi in iis quorum pulmones tuberculis jam fœdabantur; verum enimvero catarrhus mucosam nasi, faucium, et bronchiarum, membranam aggreditur, et auctâ secretionem, morbus tolletur. Phthisis vero ipsos pulmones inficit, qui nisi principiis obstiteris, suppura-bunt.

Inter excitantes phthiſeos causas, in iis saltem quorum pulmones ad labem jam sunt proclives

clives facti, fortasse hæmoptysis est annumeranda; quæ tamen morbi symptoma sæpius quam causa erit, cujusquidem rei facilis admodum et obvia ut opinor est ratio, tota pulmonum compages conficitur ex exilibus bronchiarum ramulis, parvis quæ aërem recipiunt vesiculis, vasculis sanguiniferis, absorbentibus, et nervis, quæ omnia exili membra cellulosa inter se connectuntur; unde fit, ut brevissimo tempore si adsit ulcus, ramuli aliqui corrodamur; si minutissimi solummodo ramuli abrodantur, excretio sanguine erit distincta, si majores vero immanis sanguinis vis erumpet.

Animadvertit MORGAGNI eos sæpiùs phthisi laborare qui lapidibus incidunt, inhalatis videlicet minutissimis lapidum particulis, quibus irritantur pulmones et ad inflammationem excitantur; idem de hominibus molariis, linteonibus, &c. propter similem omnino causam observatum est.

Phthisis

Phthisis profecto à tuberculis frequentissime est oriunda; de istorum vero naturâ, et modo quo enascuntur, nihil omnino certi novimus; docebat quidem SAUVAGE, concretâ in glandulis bronchialibus lymphâ, easdem fore schirrosas; hæc vero doctrina vix ad nodum solvendum valere reperietur; verum enimvêro demus lympham revera in glandulis unquam concretam fieri, quod quidem minime probatum est, imò etiam rationi maxime absolum videtur quid inde colligi potest, tubercula ubique pulmonum reperiuntur, glandulæ vero superficiem tantùm amant.

Diversæ admodum magnitudinis sunt tubercula, alia vel levissimum granulum mole suâ vix æmulantur, alia dimidium digitum altitudine referunt; non nunquam in congeries conglomerantur, quæ parvam molem habent; sunt solida, albida, cartilaginem texturâ suâ æmulantur; secta, lævem, perlucentum, uniformemque

formemque habent superficiem; in quibusdam foramina parva vides, grandiora facta cavitates habent, in quibus plus minusve puris continetur; tuberculum à quo pus dimanat vomica dicitur. In quibusdam exemplis, numero quidem paucis, calcaria materies expuebatur, hujus autem origo penitus nos latet.

Homines quindecimum inter et trigefimum quintum annum potius aggreditur phthisis, pauca tamen exempla habemus in quibus ætate provectos enecavit. Fœminæ quam mares huic morbo sunt opportuniore.

PROGNOSIS.

P R O G N O S I S.

INCIPIENS phthisis miti simillima est catarrho, et nonnullam salutis spem habet; cum jam suppurati sunt pulmones, vix quinquagesimus quisque institutis de hâc re calculis, à morbo convalescet,

C U R A T I O.

Cum morbi cujusvis causæ symptomatumque natura sunt in aprico, generalem curatorium indicationem instituere possumus, quâ nisi forsan unexpectata quædam accidant ad felicem exitum perducatur; res verò longè se aliter habet in phthisi, nam peculiaris illa
indoles

indoles qua corpus huic morbo opportunum evadit, densâ adhuc ut jam innuimus caligine merfa est ; quotidianaque nos docet experientia minimè fidendum esse innumeris illis remediis, quæ efficacissima et nunquam spem fallantia laudantur.

Quoniam vix ulla spes salutis in phthisi pulmonali affulget, causæ quæ malo originem aut occasionem dare noscuntur diligentissimè sunt arcendæ : si quis igitur ortus à parentibus hâc labe defunctis morbo huic se opportunum ostendit, ad eas migretur regiones, in quibus non ita repente, ac in nostris frigus calorem excipit ; tam subitæ enim sunt vices quas cœlum nostrum subit, ut nonnunquam postera dies hesternâ 20° frigidior evadat ; frigore vero tam repentè corpori admoto, sanguis per externa ægriùs means ad pulmones majori quam decet copiâ refluit, sicque morbum procreat. Si autem res arctæ domi locum

cum mutari non patiuntur, diligentissima vestibus detur cura; maxima profecto vestium utilitas præsertim in Britannia nostra, quæ tam subitas tempestatis mutationes habet; cum igitur tam frequens apud nostrates, et quasi iisdem propria sit phthisis, nonnihil fortasse culpanda est eorum de vestibus incuria.

Sit victus eorum qui ad phthisin sunt proclives concoctu facilis, tenuis, qui tamen corpus alat et reficiet; etiamsi hæc quibusdam majoris quam par est videantur momenti, nemo tamen qui non videat, si plus æquo oneratur distenditurque ventriculus, hoc ipso liberum pulmonum motum impediri, sicque morbum foveri: lac, olera, fruges, commode porrigentur; in partem laudis forsan non minimam quæ lacti asinino tribuebatur, veniunt campester aër, hilaritas, quæ hujus lactis usum comitari solent.

Idonea exercitatio quæ vires reficiat et renovet, inter phthiferos remedia certe primas tenet; minime vero assentimur SYDENHAMIO qui docet, “ tantum valere equitationem ad phthifin curandam, quantum mercurium ad luem veneream, aut chinamchinam ad febres intermittentes;” etiamfi mirum in modum aliis remediis opitulatur, aut fortasse primo morbi ingressu, et antequam graviora urgeant symptomata, sola curam absolvat. Navigatio omnibus fere qui de hac re scripserunt annuentibus, insigne commodum et excellentiam habet; nonnullosque phthificos de quibus jam pene conclamatum fuerat, ad vitam quasi revocavit; plurimi acutissimique viri operam haud exiguam collocarunt, in investigando modum quo tam salutaris effectus locum obtineat; tam parum vero sibi consentiunt eorum opiniones, ut prorsus prætermittendæ mihi videantur.

Plurimum

Plurimum a quibusdam laudabantur emetica, neque suæ iis fortasse defunt laudes, cum primo morbi exordio, aut etiam per ejusdem decursum parce longisque intervallis adhibentur; congestiones enim materiæ si quæ ventriculum exonerant, solvent dispellentque; Doctoris REID sententia qui ea bis de die porrigenda contendit, minime tuta mihi videtur; imo etiam bonos effectus qui a navigatione defluunt, nausææ quam excitat esse tribuendos plane affirmat; maxima tamen utilitas a navigatione aliquando percepta fuit, cum nulla nausæa occurrerat; et Doctor JAC. CAR. SMYTH in libello, quem de libratione ad phthisin debellandum maxime valente edidit, omnino asserit, navigationem nausææ vacuam melius esse profuturam: minimè quidem rationi absona videtur eorum sententia, qui emeticis quæ certe ad vires refocillandas nihil omnino valent, non promiscuè liberiorique manu esse utendum contendunt; nisi jam multa nos docuerit

docuerit experientia, iisdem morbum mitiorem nullomodo vero atrociorē effici.

Incipiente phthifica affectione, si adfunt inflammationis signa, tussis molestior, et sicca, nimia humorum abundantia, a venæsectione non est abstinendum; nonnulli per morbi etiam decursum, parcâ quidem manu, sed iteratis vicibus, sanguinem subinde detrahendum judicabant; ista vero medendi ratio manifesti periculi tam plena est, ut nullum ni fallor hodieum habeat fautorem, proindeque non sit fufius discutienda: verum enimvero generalis sanguinis detractio impetum versus pulmones nihil minuit, dum corpus jam valde exhaustum debilitatumque ut provento morbo fieri affolet, etiam facit, debilius; quis enim prudens medicus ad venæsectionem confugiet, cùm jam exhaustis viribus jacet ægrotans immanem puris vim continenter exspuens? crusta alba et tenax, nisi alia inflam-

mationis

mationis signa tali remedio opus esse moneant, minime venam iterum secundam ostendit; quidquid BOERHAAVIUS et CLIFTON WINTRINGHAM censuerint, plurima nos docent exempla, huic symptomati fidem esse dandam nullam; manifestissimæ pncumonix exemplum nuper in Nosocomio Edinensis habuimus; ingentissima erant omnia inflammationis symptomata, nulla tamen, vel minutissima hujusce crustæ particula supernatabat sanguini, qui ad morbum debellandum profusiùs detrahebatur: dudum obfoluere antiqua de inflammatoriâ crustâ commenta, probe perspectum habemus hujus crustæ formam a sanguine esse oriundam, qui cogitur tardiùs solito quod in phlegmasiis est usitatissimum, interea vero particulæ rubræ subsidunt, sicque purum gluten superficiem occupat.

Dubius est profecto setaceorum usus, etiamsi a quibusdam tanta in laude habeantur; virces enim

enim quæ jam propemodum fractæ sunt, facile exinanitione auctâ qualibet penitusque exsolventur : corpus vero maxime emungitur liquaturque puris affluentîâ, five hoc ab effuso sero, five ut quidam autumare amant, et rationi magis consentaneum videtur, a functione quâdam secretioni simillimâ ortum suum habeat ; si quis igitur incommoda quæ certissimè debilitas affert, cum laudatis sed non obviis externorum ulcerum utilitatibus bene conferat, cautus admodum ad ea confugiet.

Quæ opium habent tussim compescent, somnos faciles conciliabunt, symptomataque saltem ad tempus sublevabunt, si prudens ea porrigas ; sin nimus inflammationi favebunt ; excreationem imminuent, atrocioresque morbum efficient.

Balsamica, resinosa, oleosa, et alia innumera expectorantia, quibus tantam fidem majores habebant,

habebant, omnino negliguntur; quippe quæ, ventriculo nocuisse, nihilque commodi attulisse, reperiiebantur; multò plus utilitatis habent mucilaginosæ cum opio mixtæ.

Diarrhœa, jam profecto morbo, astringentibus et opio solummodo est mitiganda; sed sæpissime omnem curam contemnit, per intervalla recurrens, donec ad extremum exitium perveniat.

Doctrina hyperoxygenationis quæ ad variorum symptomatum rationem reddendam proponebatur, vix ullos habet hodiedum patronos, et minime discutienda sunt hujus opinionis argumenta, quæ ad rem nihil faciunt; non mirandum est tamen, celeberrimus ejus auctor, BEDDOES rerum specie opinandique præjudicio deceptus, ad ea quæ doctrinæ suæ adversabantur non respexisse; hoc vero compertum habemus, gas oxygenium pulmonibus esse

esse irritamento, aër igitur cui parcior sit oxygenii pars, phthificis fortasse aliquod levamen afferet: non tanta nunc habetur quanta olim fides gassibus, quæ adversus phthisin efficacissima, et artem nostram ab opprobrio suo vindicata, celebrabantur: non tamen omnis laudis vacua judicanda sunt, eorum usu fortasse mitescent ea symptomata, quæ sæpissimè nulla medicina removeere potest.

F I N I S.

Some tight gutters

